


QK329
.M6

Morton, Friedrich

Beiträge zur kenntnis der
flora von Nord-Dalmatien

QK329

.M6



Beiträge zur Kenntnis der Flora von Nord-Dalmatien.

Von **Friedrich Morton** (Wien).

(Mit 4 Textabbildungen.)

Aus der Summe der von mir gelegentlich der pflanzengeographischen Durchforschung der Insel Arbe und deren Nachbarinseln gemachten Pflanzenfunde veröffentliche ich im folgenden einige, die mir aus irgend einem Grunde von Interesse zu sein scheinen¹⁾.

Polypodium vulgare L. var. *serratum* Willd. f. *triangulare* Hausm.²⁾.

Insel Arbe: auf einem Kalkfelsen am N-Absturze des Cruna vrh.

Phyllitis hemionitis (Lag.) O. Kuntze. Insel Arbe: in der Formation der Felsflur am NO-Absturze des Tignarogebirges.

Ficus carica L. *erinosyce* Tschirch et Ravasini. Inseln Arbe und S. Gregorio: als Felsenpflanze am NO-Absturze beider Inseln.

Polygonum maritimum L. Insel Arbe: auf feinem Meeresschotter in der Valle S. Cristoforo; tonangebende Leitpflanze auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

P. aviculare L. var. *litorale* Koch. Insel Arbe: in der Formation des schotterigen Meeresstrandes bei der Stadt Arbe und in der Formation der Salztriften am SO-Ende der Campora.

Euphorbia literata Jacq. Insel Arbe: an salzhaltigen Stellen im Paludo und am SO-Ende der Campora.

E. pinea L. Insel Arbe: in der Formation des schotterigen Meeresstrandes in der V. S. Cristoforo und in der Formation der Salztriften am SO-Ende der Campora.

Theligonum cynocrambe L. Insel Dolin: am SW-Abhange der Insel (K.).

Sagina maritima Don. Insel Arbe: an einem Wege beim Kloster S. Eufemia; Insel S. Gregorio: in der Formation der Strandklippen bei der Pta. Plitvac.

Dianthus ciliatus Guss. Die Art zerfällt in drei von Visiani (Flora dalmat., III, 162) gut unterschiedene Varietäten; die Pflanzen des Gebietes stimmen mit den Originalen des Herbars Visiani vollkommen überein³⁾. Ich gebe im folgenden die Diagnosen der drei Varietäten, die ich gegenüber den von Visiani aufgestellten nach Durchsicht eines reichen Materials etwas geändert und erweitert habe.

¹⁾ Es wurden hier auch einzelne Funde des Herrn Dr. B. Kümmerle berücksichtigt, der mir für meine Monographie in liebenswürdiger Weise das gesamte von ihm auf Arbe gesammelte Material zur Verfügung gestellt hatte, wofür ich ihm auch an dieser Stelle herzlichst danke. In den betreffenden Fällen ist sein Name (K.) dem Standorte beigelegt.

²⁾ Revid. Paulin.

³⁾ Herr Prof. A. Béguinot (Padua) hatte die Liebenswürdigkeit, mir die Visianischen Originale zu senden, wofür ich ihm auch an dieser Stelle bestens danke.

var. *α racemosus* (Abb. 1): grundständige Blätter bis 10 cm lang, Stengel bis oben beblättert, Stengelblätter 2—5 cm lang. Blüten sitzend oder fast sitzend, oder die unteren \pm gestielt und nur einzeln, die oberen aber meist zu 2—5 büschelig und fast traubig angeordnet. Blumenblätter elliptisch bis lanzettlich.




Abb. 1 *Dianthus ciliatus* Guss. var. *α racemosus* Vis.

var. *β cymosus* (Abb. 2a): Blätter kürzer und steifer, Stengelblätter meist nur 1—3 cm lang. Blüten lang (bis 7 cm), gestielt, fast immer einzeln, rispig angeordnet. Blumenblätter eiförmig.

var. *γ Brocchianus* (Abb. 2b): Blätter sehr kurz, die grundständigen mit kurzer Knorpelspitze, eine Rosette aus meist nur 1 (—2)

Zentimeter langen, sehr starren und spitzen Blättern bildend. Stengelblätter meist stark reduziert. Meist nur 1—3 Stengel, diese ein-, selten zweiblütig, manchmal nur bis 2 cm hoch. Eine sehr charakteristische Form.

α) Insel Arbe: in der Garrigue auf der Landzunge Fercagno.



Abb. 2. *Dianthus ciliatus* Guss. var. β *cymosus* Vis. (2 a) und var. γ *Brocchianus* Vis. (2 b).

β) Insel Arbe: in der Garrigue am NO-Absturze des Cruna vrh und in der Formation der Felsflur am NO-Absturze des Tignarogebirges.

γ) Insel Arbe: in der Garrigue im südlichen Teile der Halbinsel Loparo.

- Delphinium staphisagria* L. Insel Goli: auf einem feuchten Schutt-
abhang bei „Domolo“.
- Ranunculus ophioglossifolius* Vill. var. *fontanus* Presl f. *natans* Glück¹⁾.
Insel Arbe: in Entwässerungsgräben in der Campora. In dieser Form
bisher nur aus Sizilien bekannt.
- Fumaria parviflora* Lam. Insel Arbe: auf einem Acker bei Barbato
(Rossi).
- F. capreolata* L. Insel Arbe: in einer *Paliurus*-Hecke beim Kloster S.
Eufemia und an einer Mauer bei Barbato.
- Alyssum Arduini* Fritsch. Inseln S. Gregorio und Goli: in der Formation
der Felsflur am NO-Absturze beider Inseln.
- Peltaria alliacea* Jacq. f. *crassifolia* mihi. An schattig feuchten Felsen
in der Formation der Felsflur am NO-Absturze der Inseln Arbe und
S. Gregorio. Diese durch die eigentümlichen Standortverhältnisse
(große Feuchtigkeit und starken Schatten, starken Salzgehalt der Luft
und des Bodens bei Bora) bedingte Form unterscheidet sich vom
Typus durch ihren üppigen, bis 50 cm hohen Wuchs und große,
ziemlich dicke und fleischige, bläulich bereifte Blätter.
- Tuberaria guttata* (L.) Fourreau f. *vulgaris* (Willk.) Janchen. Insel
Arbe: auf Weideboden in der „Fruga“-Alluvialmulde.
- Fumana vulgaris* Spach.²⁾ Insel Arbe: in der Garrigue am NO-Ab-
sturze des Cruna vrh und auf der Halbinsel Loparo sowie auf den
Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.
- Ruta divaricata* Ten. Insel Dolin: in der Garrigue im mittleren Teile
der Insel.
- Cotinus coggygria* Scop. Insel Arbe: in der Formation der Felsflur am NO-
Absturze des Tignarogebirges.
- Rhamnus intermedia* Steud. et Hochst. Insel Arbe: in der steinigen
Trift am SW-Abhange (K.) und NO-Absturze des Tignarogebirges;
Insel S. Gregorio: in der steinigen Trift am NO-Absturze.
- Rh. rupestris* Scop. Insel Arbe: am NO-Absturze des Tignarogebirges.
- Sedum dasyphyllum* L. Insel Arbe: zerstreut in der steinigen Trift auf
dem ganzen Tignarogebirge (auch K.); Insel Dolin: in der steinigen
Trift (K.).
- Rosa dumetorum* Thuill. var. *affinita* Thuill. **subvar. *Euphemiae***
H. Braun nova³⁾ subvar. Insel Arbe: in einer Hecke beim Kloster
S. Eufemia.
- Foliis majoribus et magis rotundatis quam in typo.
- R. agrestis* Savi **var. *Mortonii* H. Braun** nova var. Insel Arbe:
im Dundowalde.
- Rami aculeati aculeis aduncis hinc inde validis et subverticillatis.
Stipulae glandulosae angustatae. Petioli aculeolati, glandulosi et hinc
inde pilis singulis obtekti. Folia parva vel medioeria ad basin atten-
nuata hinc inde subcuneata supra glabra vel leviter pilosula, subtus
dense glandulis obtecta in margine argute multiserrata ut in Sepia-
ceis. Bracteae glabrae, in dorso ad nervum medium glandulosae, in
marginibus dense glandulis praeditae. Pedunculi glabri non elongati.

¹⁾ Det. H. Glück.

²⁾ Revid. E. Janchen.

³⁾ Alle Rosen von H. Braun bestimmt.

Receptacula ovoidea vel breviter ellipsoidea. Styli abbreviati, pilosi. Petala pallide rosacea, parva. Sepala in dorso pilosa, in margine glandulis validis oblecta post anthesin reflexa. Differt a typo stylis pilosis non elevatis, a *R. virgultorum* Rip. receptaculis non globosis sepalis non glandulosis valide oblectis etc. A *Rosa inodora* Fries differt aculeis non falcatis, sepalis post anthesin distantibus.

Pyracantha coccinea Roem.¹⁾ Insel Arbe: in der steinigen Trift am NO-Absturze des Tignarogebirges.

Astragalus Muelleri Steud. et Hochstett. Inseln Dolin und Goli: sehr vereinzelt in der steinigen Trift beider Inseln.

Medicago marina L. Insel Arbe: am Meeresstrand bei der Stadt Arbe; tonangebende Leitpflanze auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

Trifolium rubens L. Insel Arbe: Bestand von *Quercus ilex* und *Q. lanuginosa* westlich des Paludo.

T. lappaceum L. Insel Arbe: steinige Ufer beim Paludo (K.).

T. pallidum W. K. Insel Arbe: im Dundowalde.

Bunium divaricatum Bert. Inseln Arbe, Dolin und Goli: in der steinigen Trift auf den drei Inseln.

Seseli tortuosum L. Insel Arbe: in der Garrigue bei der Pta. Stolac (Halbinsel Loparo).

Libanotis daucifolia (Scop.) Rechb.²⁾ Inseln Arbe und S. Gregorio: in der Formation der Felsflur am NO-Absturze beider Inseln.

Torilis nodosa (L.) Gaertn. Insel Dolin: in der Garrigue im nördlichen Teile der Insel.

Statice virgata Willd. Insel Arbe: in der Formation der Strandklippen im westlichen Teile der Insel und auf dem Scoglio Zrinja.

Convolvulus arvensis L. var. *lanceifolius* Presl³⁾ (Abb. 3). Insel Arbe: auf einem Brachacker bei der Stadt Arbe. Ich beobachtete diese Varietät durch mehrere Jahre am selben Standort. Die Länge der Blätter beträgt im Durchschnitt 6 cm, die Breite 0·5 cm.

Calystegia soldanella (L.) R. Br. Insel Arbe: tonangebende Leitpflanze auf dem Sandstrande am SO-Ende des Loparotales.

Echium plantagineum L. Insel Arbe: Ruderalplätze beim „Campo Marzio“.

E. parviflorum Mnh. Insel Arbe: ebenda.

Melampyrum versicolor (Posp.) Fritsch⁴⁾ Insel Arbe: im Bestande von *Quercus lanuginosa* in der Mundanje glava.

Utricularia neglecta Lehm.⁵⁾ Insel Arbe: in einem Brackwassergraben am SO-Ende des Loparotales. Neu für Dalmatien.

Stachys maritima L. Insel Arbe: auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

¹⁾ Diese Pflanze wurde außerdem von A. Ginzberger in Dalmation an folgenden Orten gefunden: In einer Föhrenaufforstung bei der Eisenbahnstation Perkovic-Slivno; am Wege von Scardona zu den Kerkafällen; auf dem Scoglio Planchetta.

²⁾ Revid. A. v. Hayek.

³⁾ Revid. A. Béguinot.

⁴⁾ Det. H. Pöeeverlein.

⁵⁾ Revid. H. Glück. Dieser Fund wurde mit meinem Einverständnis bereits von Pöeeverlein in Kneuckers Allgem. botan. Zeitschr., Jahrg. 1913, publiziert.



Abb. 3. *Convolvulus arvensis* L. var. *lancifolius* Presl.

- Mentha Henrici* Borb. **var. salina** H. B.¹⁾ nova var. Insel Arbe: auf salzhaltigem Boden im Paludo.
- Differt a *M. Henrici* Borb. foliis minoribus, magis pilosis, in marginibus obsolete serratis; ceterum ut in typo.
- M. hirsuta* Huds. var. *Schleicheri* (Opiz), **forma urbensis** H. B. nova f. Insel Arbe: in den Brackwassergräben am SO-Ende des Loparotales.
- Differt a *M. hirsuta* Huds. foliis magis villosis, fere ovatis, calycibus minus villosis, ceterum ut in typo.
- M. hirsuta* Huds. **var. subpyrifolia** H. B. nova var. Insel Arbe: in einem Brackwassergraben am SO-Ende des Loparotales.
- Differt a *M. pyrifolia* H. B. (Belgrad): caules dense villosuli, folia dense pilosa vel subvillosa, breviter petiolata.
- M. tomentella* Hoffgg. et Link. Insel Arbe: in der Garrigue in der Valle Gožinka.
- M. villosa* Huds. var. *litoralis* (Borb.). Insel Arbe: auf salzhaltigem Boden im Paludo.
- Asperula laevigata* L. Insel Arbe: im Dundowalde.
- A. Staliana* Vis.²⁾ Insel S. Gregorio: in der Formation der Felsflur am NO-Absturze der Insel.
- Galium divaricatum* Lam.³⁾ Insel Arbe: in der steinigen Trift am NO-Absturze des Tignarogebirges.
- G. lucidum* All. var. *Gerardi* (Vill.). Inseln Arbe und S. Gregorio: in der steinigen Trift am NO-Absturze beider Inseln.
- G. elatum* Thuill. Insel Arbe: im Campo Marzio bei der Stadt Arbe (K.); in der Garrigue bei der Kirche S. Elia.
- Campanula istriaca* Feer. Inseln Arbe, S. Gregorio, Goli und Pervicchio: tonangebende Leitpflanze in der Formation der Felsflur der genannten Inseln.
- Bellis silvestris* Cyr. Insel Arbe: auf anstehendem Flyschboden in der Valle S. Pietro bei der Häusergruppe Bernić.
- Chrysanthemum platylepis* (Borb.) Beck. Insel Arbe: häufig in der Formation der Felsflur am NO-Absturze des Tignarogebirges.
- Senecio vulgaris* L. f. *carnosus* Posp. Ich fand diese Form, die durch ihre stark sukkulenten, bläulich bereiften Blätter sehr auffällig ist, in der Formation des Felsstrandschotters in einzelnen Buchten an der SW-Küste der Insel Arbe, sowie in der Formation der Strandklippen an den NO-Abstürzen der Inseln Arbe, S. Gregorio und Goli. Bisher aus Istrien bekannt, dürfte die Form, die lediglich als eine Anpassung an starken Salzgehalt des Bodens erscheint, wohl meist übersehen worden sein. Bei einigen Exemplaren wurden auch Strahlblüten beobachtet, was bekanntlich auch beim Typus manchmal vorkommt.
- Centaurea dalmatica* Kern. Inseln Arbe, S. Gregorio, Goli und Pervicchio: tonangebende Leitpflanze in der Formation der Felsflur der genannten Inseln.
- Cichorium pumilum* Jacq.⁴⁾ Insel Arbe: in der steinigen Trift und auf Weideboden auf dem ganzen Tignarogebirge und auf dem Cruna vrh.

¹⁾ Alle *Menthen* von H. Braun bestimmt.

²⁾ Verglichen m. d. Originalexemplaren des Herb. Visiani durch A. Béguinot.

³⁾ Alle Galien von A. Béguinot revidiert.

⁴⁾ Revid. A. Béguinot.

C. pumilum Jacq. var. *divaricatum* (Schousb.) Insel Arbe: in der Formation des schotterigen Meeresstrandes in der Valle Matevica.

Nach Fiori, „Flora analitica d'Italia“, III, 386 besitzt *C. pumilum* einen einfachen, stark verkürzten, die var. *divaricatum* einen ästigen und höheren Stamm. Es sind zwei gut unterscheidbare Formen des *C. intybus*, die aber geringen systematischen Wert besitzen.



Abb. 4. *Picris echinoides* L. forma.

Picris echinoides L.¹⁾ (Abb. 4). Insel Arbe: auf einem Flyschfelsen bei der Kirche S. Elia. Die sonst normal entwickelte Pflanze zeigt eigentümlich ausgebildete äußere Hüllblätter. Sie sind etwas größer als beim Typus und auch an der Innenseite behaart (mit einfachen borstigen Haaren), wodurch sie sich im Aussehen den Stengelblättern nähern. Wir haben jedoch von der Aufstellung einer Form, bzw. Varietät vorderhand noch abgesehen, da ich nur zwei Exemplare fand

¹⁾ Det. Eberstaller et Morton.

und außerdem an eine monströse Bildung, bzw. an die Einwirkung eines Insektes gedacht werden konnte.

Scorzonera austriaca Willd. f. *stenophylla* Beck. Insel Arbe: in der Formation der Strandklippen am Cap Fronte.

Reichardia picroides (L.) Roth var. *maritima* Fiori. Inseln Arbe, S. Gregorio und Goli: tonangebende Leitpflanze in der Formation der Felsflur am NO-Absturze der drei Inseln.

Hieracium Bauhini Schult. ssp. *clarisetum* Morton et Zahn, nova ssp.¹⁾. Insel Arbe: im Dundowalde.

Caulis gracilis, ad 75 cm altus, effloccosus, disperse, apice modice setosus et sparsim glandulosus. Folia glauca, effloccosa, modice subsetosociliata (3—4 mm), glabrescentia, oblongo-lanceolata, obtusa, subspathulata, inferiora etiam in parte superiore modice longiusque setosa, caulina 5, lanceolata, sensim decrescentia, remota, setoso-ciliata. Anthela apice umbellata, densiuscule setosa, modice glandulosa, subeffloccosa, setis 2—3 mm longis apice dilutis. Acladium breve, rami ad 7 tenues subcymosi. Ordines axium 3—4, capitula 20 vel compluria. Pedunculi densiuscule setosi, disperse floccosi, subglandulosi. Involucra obscure virescentia, cylindrico-ovata, densiuscule setulosa, disperse glandulosa, effloccosa. Squamae sublatiusculae, dorso pilorum basi nigra obscurae, margine late et pallide virides. Ligulae luteae. Stolones graciles, elongati, effloccosi, modice setosi, foliis remotis sublongis lanceolatis obsiti.

H. pilosella L. ssp. *minuticeps* N. P. *obscurum* Morton et Zahn. Insel Arbe: im Capofrontewalde.

Squamis margine virescentibus subeffloccosis.

Althenia filiformis Fr. Insel Arbe²⁾: in einem Tümpel bei den Ruinen von S. Damiano. Da am Material entwickelte weibliche Blüten sowie Früchte fehlen, ist die Bestimmung nicht mit absoluter Sicherheit durchzuführen gewesen. Nach G. Fischer spricht für *Althenia* die ungemein zarte Form der gelblich-weißen Stengel und der büschelig gehäuften, fadenförmigen, nervenlosen Blätter, sowie ein ♂ Blütchen, das im Gegensatz zu *Zanichellia* am Grunde bescheidet ist.

Scilla autumnalis L. Insel Arbe: Verbreitet und häufig im ganzen Kalk der Insel.

Ruscus hypoglossum L. Insel Arbe: im Capofrontewalde bei der Valle Armata.

Juncus Gerardi Lois. Insel Arbe: in der Formation der Meeressimsen am SO-Ende der Campora.

Luzula Forsteri (Sm.) DC. Insel Arbe: im Capofrontewalde.

Crocus longiflorus Raf. Insel Arbe: in der steinigen Trift bei den Ruinen von S. Damiano (Jávorka).

C. reticulatus Stev. Insel Arbe: in der steinigen Trift auf dem Rücken des Tignarogebirges.

Gladiolus illyricus Koch. Insel Arbe: im Dundo- und Capofrontewalde, in den Waldbeständen westlich des Paludo und in der Mundanje glava.

Scirpus litoralis Schrad. Insel Arbe: sehr vereinzelt in Brackwassergräben und -Tümpeln der ganzen Insel.

¹⁾ Die Hieracien von H. Zahn bestimmt.

²⁾ Revid. G. Fischer.

Carex distachya Desf.¹⁾. Insel Dolin: in der Garrigue im nördlichen Teile der Insel.

C. pallescens L.¹⁾. Insel Arbe: im Dundowalde.

Tragus racemosus (L.) Ail.²⁾ Insel Arbe: auf Sandäckern in der Valle S. Pietro und auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

Stipa aristella L. Insel Arbe: in der Garrigue am N-Absturze des Cruna vrh.

Phleum arenarium L. Insel Arbe: dominierend auf den Strandwiesen, vereinzelt auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

Ammophila pallida (Presl) Fritsch var. *australis* (Mab.). Insel Arbe: auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

Sesleria tenuifolia Schrad. Insel Arbe: häufig in der steinigen Trift am NO-Absturze des Tignarogebirges.

S. autumnalis (Scop.) Schultz. Insel Arbe: in der Garrigue in der Valle Gožinka; unter einer Steineichengruppe bei der Kirche S. Elia.

Koeleria splendens Presl. Inseln S. Gregorio und Goli: in der steinigen Trift im westlichen Teile beider Inseln.

Atropis festucaeformis Richter. Insel Arbe: auf den Salinenböden am NW-Ende des Valle S. Pietro.

Festuca rubra L. var. *vulgaris* Gaud. **subv. *glaucophylla* Hack.** nova subvar. Insel S. Gregorio: in der Formation der Felsflur am NO-Absturze der Insel.

Differt a subv. *typica* foliis leviter pruinosis (non tantum glaucescentibus). Valde affinis *F. rubrae* subv. *pruinosa* Hack. in Rep. Bot. Ex. Cl., 1884, p. 119, sed hujus folia subjuncea, panicula angusta etc.

Vulpia dertonensis (All.) Gola. Insel Arbe: in der steinigen Trift auf dem Rücken des Tignarogebirges.

V. fasciculata (Forsk.) Fritsch. Insel Arbe: bestandbildend auf den Strandwiesen und vereinzelt auf den Sanddünen am SO-Ende des Loparotales.

Serapias lingua L. Insel Arbe: im Dundowalde und auf den Flyschkegeln westlich des Paludo (hier auch K.).

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. Insel Arbe: im Capofrontewalde.

¹⁾ Revid. A. Kneucker.

²⁾ Alle Gräser von E. Hackel bestimmt, bzw. revidiert.

New York Botanical Garden Library

QK 329 .M6
Morton, Friedrich/Beitrage zur Kenntniss

gen



3 5185 00110 1821

